

A.M.X.[®] 50% Soluble



AMOXICILINA TRIHIDRATADA

POLVO ORAL SOLUBLE

Antimicrobianos

FORMULA:

Cada 100 g contienen:
Amoxicilina trihidratada 50 g
Excipiente cbp 100 g

Contenido neto: 500 g

USO VETERINARIO:



CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO

Su venta requiere receta médica.

INDICACIONES:

A.M.X. 50% Soluble: Se usa para la prevención y tratamiento de enfermedades, en las especies indicadas, causadas por gérmenes sensibles a la amoxicilina, como son:

Aves: (reproductoras, engorda y postura) y **pavos:** Sinusitis, coriza, artritis, colibacilosis, salmonelosis, clostridiasis, nefritis, estafilococosis y ORT (*Ornithobacterium rhinotracheale*).

Cerdos: Bacterias asociadas al complejo respiratorio porcino (excepto *Mycoplasma spp*), al síndrome mastitis metritis agalactia (MMA), algunas nefritis, cistitis y dermatitis, así como en streptococosis.

Bovinos (productores de carne y leche): Enfermedades espiratorias, onfalitis, enteritis infecciosa, artritis, colibacilosis, salmonelosis e infecciones urinarias.

DOSIS:

La dosis recomendada de amoxicilina es de 10 a 20 mg/kg de peso durante 3 a 5 días.

Aves: Esta dosis se obtiene normalmente agregando 20 a 30 g de A.M.X. 50% Soluble por cada 200 litros de agua de bebida.

Cerdos y Bovinos: Esta dosis se obtiene agregando diariamente 25 a 50 g de A.M.X. 50% Soluble (dependiendo del consumo de agua y el peso de los animales) por cada 100 litros de agua de bebida.

Nota: Es recomendable, realizar una pre-dilución de la dosis en un volumen menor de agua (25 a 50 g de A.M.X. 50% Soluble en 10 a 20 litros de agua) después vaciarlo y mezclarlo en el tanque o bebedero.

VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral en el agua de bebida.



Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-127

ADVERTENCIAS:

- Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria, no se use en humanos.
- No se deje al alcance de los niños.
- Conserve a temperatura ambiente a no más de 30°C.
- No usar este producto 14 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano.
- No utilizar para consumo la leche procedente de animales tratados, hasta 14 días después de la última aplicación.
- El huevo de las aves tratadas no deberá consumirse hasta 14 días después de terminado el tratamiento.
- No debe ser manejado por personas sensibles a las penicilinas.

Salud animal
Bienestar humano[®]