

ACTYNOCEF®



CEFTRIAXONA 4 g

SOLUCION INYECTABLE

Antimicrobianos

FORMULA:

Cada frasco contiene:

Ceftriaxona disódica equivalente a de ceftriaxona base 4000 mg

Contenido neto: 12 frascos de 4 g c/u.

USO VETERINARIO:



CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO

Su venta requiere receta médica cuantificada para uso exclusivo del médico veterinario.

INDICACIONES:

En cerdos ACTYNOCEF polvo soluble estéril, está indicado en el tratamiento del Complejo Respiratorio Porcino asociado a *Actinobacillus pleuroneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Haemophilus spp.*, *Salmonella spp.* y gérmenes de asociación como *Escherichia coli* y *Klebsiella pneumoniae*. Invitro ACTYNOCEF ha demostrado excelente actividad frente a bacterias grampositivas y gramnegativas incluyendo *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus spp.*, *Clostridium perfringens* y *Proteus spp.* Debido a la elevada concentración alcanzada por ACTYNOCEF a nivel renal, está indicado en el tratamiento de infecciones del sistema urogenital del cerdo causadas por gérmenes sensibles a la ceftriaxona.

En aves: Para las complicaciones de enfermedades respiratorias, coriza infecciosa, cólera aviar, pododermatitis bacteriana, salmonella, colibacilosis, clostridiasis y prevención de la mortalidad temprana por transmisión vertical y horizontal de las incubadoras. También se usa para la prevención y tratamiento de las infecciones bacterianas del pollito al primer día.

DOSIS:

ACTYNOCEF debe ser reconstituido agregando al frasco ampula 100 ml de agua bidestilada estéril. Cada ml de la solución resultante tendrá 40 mg de ceftriaxona.

En cerdos: debe administrarse a razón de 1 ml por cada 10 a 20 kg de peso (4-2 mg/kg de peso). Para mejor resultado se recomienda administrar la primera dosis a razón de 4 mg/kg, pudiendo repetir el tratamiento a las 12-24 horas a razón de 2 mg/kg de peso. El tratamiento se puede prolongar 48 horas más.

En aves: 2 a 4 mg/kg de peso vivo. Ver instructivo anexo.

VIA DE ADMINISTRACIÓN:

En cerdos: Intramuscular o intravenosa.

En aves: subcutánea y/o intramuscular.



Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-084

ADVERTENCIAS:

- Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria, no se use en humanos.
- Consérvese a Temperatura ambiente a no más de 30°C y protéjase de la luz.
- No se deje al alcance de los niños.
- El uso de antibióticos β-lactámicos como la Ceftriaxona puede provocar reacciones de hipersensibilidad que van desde prurito, fiebre, diarrea, vómito, hasta Anafilaxia No administrar en animales que hayan mostrado hipersensibilidad a antibióticos β-lactámicos ni 48 hrs. antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano.
- Ya reconstituido deberá almacenarse en refrigeración de 2-8° C hasta por 7 días y a temperatura ambiente hasta 12 horas.
- No se han encontrado efectos tóxicos aún con sobredosis de 20 veces la dosis recomendada.

Salud animal
Bienestar humano®