

Dipirona

Antiinflamatorios

FORMULA:

Cada ml contiene:

Dipirona	500 mg
Vehículo cbp	1 ml

Contenido neto: Frasco con 20 ml, 50 ml, 100 ml y 250 ml5

USO VETERINARIO:



Analgésico, antipirético, antiespasmódico y coadyuvante antiinflamatorio.

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO

Su venta requiere receta médica cuantificada para uso exclusivo del médico veterinario.

INDICACIONES:

ALNEX está indicado en equinos, bovinos (carne), ovinos, caprinos, porcinos, perros y gatos, como analgésico, antipirético, antiespasmódico y coadyuvante antiinflamatorio.

-Se recomienda para bajar rápidamente la fiebre que aparece en enfermedades infecciosas.

-Para mitigar el dolor y los espasmos gastrointestinales y de útero (cólicos), en heridas, contusiones, desgarros, afecciones musculares y articulares.

-En cerdas para evitar el canibalismo de los lechones debido a dolor post-parto.

-Obstrucciones por cuerpos extraños en esófago.

-Contra el dolor y/o fiebre postquirúrgicos.

-Para prevenir el dolor en maniobras exploratorias como en ginecología, traumatología, ortopedia, urología, odontología y cólicos intestinales.

DOSIS:

En general, la dosificación es de 25 mg/kg de peso corporal.

Se recomiendan:

Equinos y bovinos:	20-60 ml
Potros y terneros:	5-15 ml
Ovinos y caprinos:	2-8 ml
Porcinos adultos:	10-30 ml
Lechones:	2-5 ml
Perros y gatos:	0.5-3 ml

VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Intravenosa lenta o intramuscular profunda cada 4 a 8 horas.



Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-013

ADVERTENCIAS:

- Este es un producto veterinario, no apto para el uso en humanos.
- Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C.
- No se deje al alcance de los niños.
- No se administre este producto a equinos destinados al consumo humano.

Tiempo de Retiro:

Cerdos: No utilizar el producto 17 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano.

Bovinos: 9 días después de la última inyección intravenosa y 28 días después de la última inyección intramuscular.