

BASETYL® MAX



Florfenicol/ Tilosina/ Bromhexina

SOLUCION INYECTABLE

Antimicrobianos

FORMULA:

Cada 100 ml contienen:

Florfenicol	20.0 g
Tilosina base	20.0 g
Clorhidrato de Bromhexina	0.5 g
Vehículo cbp	100 ml

Contenido neto: Un frasco con 100 ml

Un frasco con 250 ml

USO VETERINARIO:



Mezcla de antibióticos de amplio espectro y un expectorante.

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO

Su venta requiere receta médica.

INDICACIONES:

BASETYL MAX: Es una mezcla de antibióticos de amplio espectro, que incluye un expectorante. En los bovinos de carne, terneros y ganado lechero en periodo seco, se usa en el tratamiento de enfermedades respiratorias, diarreas de terneros, pododermatitis, queratitis, infecciones del tracto genital e infecciones en general, causadas por: *Manheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Klebsiella spp*, *Shigella spp*, *Moraxella spp*, *Histophilus somni*, *Haemophilus somnus*, *Corynebacterium pyogenes*, *E. coli*, *Salmonella*, *Streptococcus*, *Staphylococcus*, *Bacteroides nodosus* y *Bacteroides melanogenicus*, así como las infecciones asociadas o complicadas por *Mycoplasmas*, como *Mycoplasma bovis* y *Mycoplasma spp*.

En cerdos se usa para el tratamiento de enfermedades del tracto respiratorio como: *pleuropneumonía*, *pasteurelosis*, *neumonía enzootica*, rinitis atrófica y en diarreas por *E. coli* y *Salmonella* y en infecciones asociadas o complicadas con *M. hyopneumoniae* entre otra.

DOSIS:


Cerdos y bovinos (de carne, terneros y ganado lechero en periodo seco): 1 ml por cada 20 Kg de peso, si los signos persisten repetir la aplicación del producto a las 48 o 72 horas.

VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular profunda.

CONTRAINDICACIONES:

No se conocen contraindicaciones para este producto cuando se usa como es indicado.



Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-243

EFFECTOS SECUNDARIOS:

En cerdos: se ha observado una inapetencia transitoria durante el tratamiento y a dosis altas, un enrojecimiento de la zona anal y reblandecimiento de las heces fecales. Estos trastornos son transitorios y no afectan la ganancia de peso

ADVERTENCIAS:

- Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria, no se use en humanos.
- Conservar a temperatura ambiente y protegido de la luz.
- No se deje al alcance de los niños.
- No administrar más de 20 ml en el mismo punto de inyección.

PERÍODO DE RETIRO:

- No administrar 38 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano.
- En animales destinados a la producción láctea, no administre el producto cinco días antes del parto y nunca lo administre durante la etapa de producción láctea.

Salud animal
Bienestar humano®