

CALCIOSOL[®] FORTE



Calcio y Fósforo

Solución Inyectable

Estimulantes del apetito vitaminas y hematopoyéticos

FORMULA:

Cada 100 ml contienen:

Gluconato de calcio	53.65 g
Fosfato dibásico de sodio	0.65 g
Vehículo cbp	100 ml

Contenido neto: Un frasco con 100 ml

USO VETERINARIO



CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO

INDICACIONES:

CALCIOSOL FORTE es una solución estéril de gluconato de calcio al 53.65%, complementado con fósforo, usada en bovinos (productores de carne y leche), equinos, ovinos, cerdos, caprinos y perros.

Eficaz para el tratamiento de deficiencias del calcio relacionadas al parto y la lactancia, raquitismo y deficiencias nutricionales.

Está indicado en la hipocalcemia o fiebre de hembras parturientas y en problemas relacionados como paresias o tetanias de la preñez, eclampsia, osteomalacia y raquitismo. Intoxicaciones por metales pesados. Envenenamiento por piquetes de insectos o mordeduras de serpiente.

De utilidad en algunas alergias y problemas de coagulación de la sangre y en general en deficiencias nutricionales de calcio.

Así mismo, está indicado en trastornos de la conducción nerviosa y regulación del tono muscular; como en la debilidad de contracciones uterinas en el parto.

DOSIS:

Bovinos: De 90 a 115 ml

Equinos: De 45 a 115 ml

Ovinos, Cerdos y Caprinos: De 22 a 70 ml

Perros: De 1.5 a 9 ml

VIA DE ADMINISTRACION:

La administración debe hacerse por vía intravenosa lenta (20 a 25 minutos por cada 250 ml).

Pueden emplearse las vías intramuscular o subcutánea diluyendo el producto



Reg. SAGARPA Q-7833-128

ADVERTENCIAS:

Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria, no se use en humanos.

Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C y protéjase de la luz.

No se deje al alcance de los niños.

Hacer siempre la aplicación endovenosa muy lentamente.

Todas las sales de calcio por vía I.V. pueden favorecer la presentación de shock.

El bloqueo cardiaco puede presentarse especialmente en el caballo.

No se administre en combinación con sulfas.

Caliente el producto a temperatura corporal.

La carne y leche de los animales tratados puede ser consumida 24 horas después de haberse administrado el producto.

No se use en caballos destinados al consumo humano.

Salud animal
Bienestar humano[®]