

Monensina

POLVO ORAL

Aditivos para el alimento premezclas

FORMULA:

Cada 100 g contienen:

Monensina Sódica equivalente a	40.00 g
Monensina	
Excipiente cbp	100.00 g

Contenido neto: 25 kg

USO VETERINARIO:



CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO

Su venta requiere receta médica.

INDICACIONES:

Indicado en aves (pollo de engorda, pollitas de reemplazo), pavos, bovinos (productores de carne y leche) y caprinos, para el control y tratamiento de coccidiosis y para el control de cetosis y timpanismo.

DOSIS:

Aves: Pollo de engorda de 100 a 125 g de Monensina por tonelada de alimento (250 a 312.5 g de COCCILIBER por tonelada de alimento), hasta la salida de las aves al mercado.

Pollitas de reemplazo de 100 a 120 g de Monensina por tonelada de alimento (250 a 300 g de COCCILIBER por tonelada de alimento) hasta las 16 semanas de edad.

Pavos de 60 a 100 g de Monensina por tonelada de alimento (150 a 250 g de COCCILIBER por tonelada de alimento) hasta las 16 semanas de edad.

Bovinos y Caprinos:

De 7 a 33 g de Monensina por tonelada de alimento (17.5 a 82.5 g de COCCILIBER por tonelada de alimento).

VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral mezclado con el alimento.

PERIODO DE RETIRO:

Carne: Cero días.

Leche: Cero días.

Aves: Suspender la administración de este producto, por lo menos, 1 día antes del sacrificio para consumo humano.



Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-167

ADVERTENCIAS:

- Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria, no se use en humanos.
- Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30 °C, en un lugar seco.
- No se deje al alcance de los niños.
- No deberá administrarse a equinos, perros, aves acuáticas y gallinas de guinea.
- Cuando mezcle y maneje COCCILIBER use ropa, guantes y mascarilla protectora.
- Lávese las manos después de su uso.

No se administre este producto a aves en producción de huevo que se destine al consumo humano.

En aves no se debe usar con sulfacloropiridazina, tiamulina, oleandomicina o troleandomicina.

No se administre a pavos y pollas de reemplazo mayores a 16 semanas de edad.

No usar en gallinas y pavas ponedoras.