

Decoquinato

PREMEZCLA ORAL

Aditivos para el alimento premezclas

FORMULA:

Cada 100 g contienen:

Decoquinato	12.0 g
Excipiente cbp	100.0 g

Contenido neto: 25 kg

USO VETERINARIO:



CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO

Su venta requiere receta médica.

INDICACIONES:

COCCIMAX: Previene el desarrollo de las coccidias y el daño causado por éstas.

Minimiza las pérdidas causadas por la coccidiosis subclínica. Duración de actividad más prolongada, disponible para prevenir la coccidiosis con efectividad.

Aves (pollo de engorda y pollita de reemplazo): Prevención de coccidiosis causada por *E. tenella*, *E. necatrix*, *E. acervulina*, *E. mitis*, *E. máxima* y *E. brunetti*.

Bovinos (productores de carne y leche):

Prevención y tratamiento de coccidiosis causada por *E. bovis* y *E. zurnii*.

Caprinos: Prevención y tratamiento de coccidiosis causada por *E. christensenii*, *E. ninakohlyakimovae* y *Cryptosporidium parvum*.

Ovinos: Prevención y tratamiento de coccidiosis causada por *E. bakuensis*, *E. crandallis*, *E. ovinoidalis* y *E. parva*.

DOSIS:

Para prevención de coccidia en aves: 250 g de producto terminado (30 ppm)/tonelada de alimento. Uso continuo.

Prevención y tratamiento en bovinos, ovinos y caprinos:

0.5-1.0 mg/kg de peso durante 28 días (0.5-1.0 g de producto terminado por cada 120 kg de peso tratados).

Para la prevención y tratamiento de criptosporidiosis en

Caprinos: 2.5 mg/kg durante 21 días.

VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral, mezclado con el alimento.



Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-239

ADVERTENCIAS:

- Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria, no se use en humanos.
- No se deje al alcance de los niños.
- Consérvese en un lugar fresco y seco. Cerrar después de su uso.
- No se administre a aves en producción de huevo destinado al consumo humano (aves ponedoras).
- Este producto tiene un tiempo de retiro para carne y leche de cero días.