

COCCITRAK® 5%



Toltrazuril

SUSPENSIÓN ORAL

Antiparásitarios

FORMULA:

Cada ml contiene:

Toltrazuril	50 mg
Vehículo cbp	1 ml

Contenido neto: : Un frasco con 20 ml
Un frasco con 50 ml
Un frasco con 100 ml
Un frasco con 250 ml
Un dosificador

USO VETERINARIO:



CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO

Su venta requiere receta médica.

INDICACIONES:

COCCITRAK 5%: se usa en la prevención y tratamiento de infecciones causadas por coccidias y protozoarios en cerdos, bovinos (de leche y de carne), ovinos, caprinos, caninos (perros) y felinos (gatos). Su amplio espectro incluye todas las especies de coccidias en todas sus fases incluyendo esquizogonia y gametogonia. Su actividad contra macro y microgametos lo caracteriza sobre otros compuestos anticoccidianos. Está indicado para uso neonatal contra *Isoospora suis* en lechones.

También se utiliza contra *Toxoplasma*, *Sarcocystis*, *Theileria*, *Isoosporas* y *Cystisporas*.

Es compatible con aditivos alimenticios, otros anticoccidianos y medicamentos comúnmente empleados en la producción.

No interfiere negativamente en la ganancia de peso y la conversión alimenticia.

No altera el consumo de agua ni de alimento.

DOSIS:

Cerdos, bovinos (de leche y de carne), ovinos, caprinos y caninos (perros): 20 mg/kg de peso vivo (1 ml/2.5 kg de peso vivo).

En el caso de lechones sería la misma dosis entre los 3 y 6 días de edad.

En becerros se recomienda una dosis de 15 mg/kg de peso vivo (1 ml/3.3 kg de peso vivo).

En caso de *Theileria annulata* en bovinos se recomienda aumentar la dosis a 25 mg/kg de peso vivo (1 ml/2 kg de peso vivo).

Felinos (gatos): 10 mg/kg de peso vivo (1 ml/5 kg de peso vivo).



Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-202

ADVERTENCIAS:

- Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria, no se use en humanos.
- No se deje al alcance de los niños.
- Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C.
- La carne de animales tratados no debe ser consumida en un periodo de 70 días posteriores al tratamiento.
- Por su prolongado periodo de retiro no se recomienda su uso en animales en producción láctea.
- En vaquilla gestante puede ser utilizado el producto hasta 70 días antes del parto.

VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral.

Salud animal
Bienestar humano®