

FIST GEL®

Abamectina



Control de vectores y pulgicida



FORMULA:

Abamectina: no menos de 0.05%
Vehículo c.b.p.: no más de 99.95%

PRESENTACIONES:

Pellets: exhibidor con 20 cajitas con 25 g c/u
Cereal: Cubeta con 5 kg y costal 25 kg.
Cubeta con 5 kg con bloques de 10 g c/u

USO VETERINARIO: 

MECANISMO DE ACCIÓN :

Actúa por ingestión. Estimula la liberación del Ácido Gamma Amino butírico (GABA) en los artrópodos inhibiendo la transmisión neuro muscular. Los insectos y ácaros sensibles a la abamectina son paralizados y mueren. Tiene un efecto retardado sobre la cucaracha permitiéndole llegar a su área de agregación y se lleve a cabo el efecto dominó.

DOSIS:

Cucaracha germánica batella germanica 0.25 – 1.0 g/m².
Cucaracha americana periplaneta americana (tamaño de punto de aplicación).
Cucaracha oriental blatta orientalis 0.05 cm de diámetro.

INSTRUCCIONES DE USO:

Aplique 1 cm³ por cada m² en los lugares donde tenga problemas, en lugares con infestaciones severas se recomienda no menos de 10 puntos por m².

ADVERTENCIAS:

No coma, beba o fume durante la aplicación del producto.
Deje el producto fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
No reutilice el envase.



Reg. RSCO-DOM-INAC-174-301-092-0.050

