

Vitamina A, D3 y E

SOLUCION INYECTABLE

Estimulantes del apetito vitaminas y hematopoyéticos

FORMULA:

Cada ml contiene:

Vitamina A	500,000 U.I
Vitamina D-3	75,000 U.I.
Vitamina E	50 U.I.
Vehículo cbp	1 ml

Contenido neto: 20 ml, 100 ml y 500 ml

USO VETERINARIO



CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO

INDICACIONES:

SEBA ADE: está indicado para la prevención y tratamiento de deficiencias de las vitaminas A, D3 y E en bovinos (productores de carne y leche), equinos, porcinos, ovinos y caprinos, en épocas de sequía y escasez de pasto, en la disminución de la producción de leche, lana y carne.

SEBA ADE permite la adecuada regulación de los niveles de calcio y fósforo para el desarrollo normal de los huesos y evitar problemas de raquitismo, osteoporosis y osteomalacia.

SEBA ADE previene la presentación de trastornos metabólicos como la enfermedad del músculo blanco.

En ganado de engorda SEBA ADE contribuye a incrementar la ganancia diaria de peso y mejorar la conversión alimenticia.

SEBA ADE sirve como coadyuvante en problemas de infertilidad y baja fecundidad y trastornos del metabolismo asociados a deficiencias de estas vitaminas. En sementales SEBA ADE interviene en la función reproductiva estimulando la espermatogénesis.

En cerdas la aplicación de SEBA ADE al momento del destete y en el empadre aumenta el tamaño de la camada, el número de lechones nacidos vivos y número de lechones destetados en el parto subsecuente.

En estados de estrés causados por cambios de clima, aglomeración, transporte, vacunación, castración. En lechones al momento del destete SEBA ADE aumenta la tasa de sobrevivencia y mejora su desempeño productivo.


SEBA ADE ayuda a mejorar la respuesta inmune humoral y celular.

DOSIS:

La dosis es por animal, bovinos y equinos: 2-6 ml, en lechones menores a 8 días administrar 0.25 ml, en lechones de entre 9 y 21 días administrar 0.5 ml, en cerdos mayores a los 21 días administrar de 1 a 3 ml; ovinos y caprinos: 0.5-3 ml; dependiendo de las necesidades se puede repetir el tratamiento.

VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Bovinos: intramuscular, ovinos y caprinos: intramuscular y subcutánea; porcinos y equinos: intramuscular profunda.



REGISTRO SAGARPA Q-7833-067

ADVERTENCIAS:

- Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria, no se use en humanos.
- Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C y protéjase de la luz.
- No se deje al alcance de los niños.
- No se administre en caninos.
- En equinos no aplicar más de 4 ml en el mismo sitio.
- Para su aplicación usar exclusivamente agujas y jeringas estériles.