

CLORHIDRATO DE ZILPATEROL

Aditivos para el alimento premezclas

POLVO (Premezcla)

FORMULA:

Cada kg contiene:

Clorhidrato de Zilpaterol	48 g
Excipiente cbp	1 kg

Contenido neto: 5 kg y 10 kg

USO VETERINARIO:



Promotor del crecimiento y rendimiento.

No esteroide

CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO

Su venta requiere receta médica cuantificada para uso exclusivo del médico veterinario.

INDICACIONES:

ZIPAMIX®: Indicado en ganado bovino de engorda en etapa de finalización para aumentar la tasa de ganancia de peso y mejorar la conversión alimenticia. Aumenta el rendimiento de la canal y disminuye el depósito de grasa para la obtención de carne magra. Véase instructivo anexo.

DOSIS:

Adminístrese continuamente, durante los últimos 30 días de la engorda en corral, a razón de 0.15 mg de Clorhidrato de Zilpaterol por kg de peso corporal al día. Para aproximarse a la dosis, se deben tomar en cuenta: el promedio de peso corporal de los animales y el promedio individual de consumo de alimento. Por ejemplo, para animales con peso promedio de 400 kg que ingieren, en promedio, 10 kg de alimento terminado (90% de materia seca) por día, se recomiendan 125 g de ZIPAMIX® por tonelada de alimento terminado.

Para el cálculo más preciso de la cantidad de Zipamix® a incluir en la dieta, se recomienda el uso de la siguiente fórmula:

$$\frac{3.125 \text{ (constante)} \times \text{Promedio de peso corporal (kg)}}{\text{Promedio de consumo de alimento (kg)}} = \boxed{\begin{array}{l} \text{Gramos de} \\ \text{Zipamix}^{\circledR} \\ \text{por tonelada} \\ \text{de alimento} \end{array}}$$

Se sugiere mezclar previamente en la premezcla mineral y vigilar apropiadamente el proceso de mezclado.

VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral, mezclado con el alimento.



REGISTRO S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-242

ADVERTENCIAS:

- Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria, no se use en humanos.
- Para un almacenamiento prolongado, hasta su caducidad, consérvese en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente (< 25°C), perfectamente cerrado.
- No se deje al alcance de los niños, ni de los animales domésticos.
- Durante su manejo, se recomienda utilizar guantes, mascarilla con filtro, lentes protectores y overol.
- Evite la inhalación directa del producto y el contacto directo con la piel y ojos.
- No coma ni fume durante su manejo.
- En caso de contacto con la piel, enjuague con abundante agua; en caso de accidente, llame al médico.
- En caso de sospecha de intoxicación por su ingestión o inhalación accidental, puede ser útil un bloqueador β -2 adrenérgico, como el propanolol, bajo estricta supervisión médica.

PERÍODO DE RETIRO:

El tratamiento debe suspenderse, por lo menos, 72 horas (3 días) antes del sacrificio animal para consumo humano.