

# CLINDAPIS® Oral



## Clorhidrato de Clindamicina

Antimicrobianos

### FORMULA:

Cada ml contiene:

Clorhidrato de Clindamicina equivalente a de Clindamicina	25 mg
Vehículo cbp	1 ml

**Contenido neto:** Un frasco con 20 ml con jeringa dosificadora 5 ml

**USO VETERINARIO:**



**Antibacteriano.**

### CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO

Su venta requiere receta médica.

### INDICACIONES:

CLINDAPIS Oral: Antibacteriano indicado en perros y gatos para el tratamiento de infecciones causadas por bacterias Gram positivas y Gram negativas sensibles a la acción de la clindamicina, en piodermas, heridas infectadas, abscesos, infecciones de la cavidad bucal, dientes y osteomielitis.

### DOSIS:

**Perros:** Para pioderma por estafilococos: 11 mg (0.44 ml)/ kg de peso corporal, cada 24 horas por 7 a 28 días.

Para heridas infectadas, abscesos e infecciones de la cavidad bucal y dientes administrar: 5.5-33.0 mg (0.22-1.32 ml)/ kg de peso corporal cada 12 horas, por 7 a 28 días. Osteomielitis: administrar de 11.0-33.0 mg (0.44-1.32 ml)/ kg de peso corporal cada 12 horas, por 7 a 28 días.

**Gatos:** heridas infectadas, abscesos e infecciones de la cavidad bucal y dientes: De 11.0-33.0 mg (0.44-1.32 ml)/ kg de peso corporal cada 24 horas, por un máximo de 14 días.

Véase instructivo anexo.

### VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral.



Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-273

### ADVERTENCIAS:

- Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria, no se use en humanos.
- Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C, lejos de la humedad y el calor.
- No se deje al alcance de los niños.
- No administrar en animales con hipersensibilidad a la lincomicina y a la clindamicina.
- Sí se presenta diarrea, colitis y náusea, suspenda el medicamento.
- En pacientes con enfermedades renales o hepáticas graves, considere una reducción de la dosis.
- No usar en conjunto con agentes bloqueadores neuromusculares ya que se ha observado que presenta propiedades bloqueadoras que pudieran alterar su acción.

Salud animal  
Bienestar humano®