

## SALINOMICINA SODICA 12%

Aditivos para el alimento premezclas

### FORMULA:

Cada 1000 g contienen:

Salinomicina sódica	120.0 g
Excipiente cbp	1000.0 g

**Contenido neto:** 25 kg

### USO VETERINARIO:



### CONSULTE AL MEDICO VETERINARIO

Su venta requiere receta médica.

### INDICACIONES:

PISACOX®: Para el tratamiento y control de coccidias en aves: pollo de engorda y pollitas de reemplazo (*E. acervulina*, *E. máxima*, *E. tenella*, *E. mitis*, *E. necatrix* y *E. praecox* y *E. brunetti*) y conejos. También para el tratamiento de infecciones causadas por bacterias Grampositivas y bacterias anaerobias como *Clostridium perfringens*.

### DOSIS:

Pollos y pollitas de reemplazo menores a las 14 semanas de edad: Mezclar perfectamente 500 g de PISACOX® por tonelada de alimento para obtener una concentración de 60 g de Salinomicina sódica/tonelada de alimento (60 ppm). Administrar desde el primer día de edad.

### Bovinos:

En becerros y novillos: de 50 a 150 g de PISACOX® por tonelada de alimento (6 a 18 ppm). En animales con rumen completamente desarrollado: 300 g de PISACOX® por tonelada de alimento (36 ppm).

### Cerdos:

Lechones hasta los 4 meses de edad: Agregar de 125 a 250 g de PISACOX® por tonelada de alimento (15 a 30 ppm).

En cerdos mayores a los 4 meses: Agregar de 250 a 500 g de PISACOX® por tonelada de alimento (30 a 60 ppm).

### Conejos:

De 170 a 210 g de PISACOX® por tonelada de alimento (20 a 25 ppm).

### VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral, mezclado con el alimento.



Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-7833-195

### ADVERTENCIAS:

- Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria, no se use humanos.
- Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C en un lugar seco.
- No se deje al alcance de los niños.
- No administrar a equinos, pavos, ni a pollas de reemplazo mayores a las 14 semanas de edad o ponedoras en producción.
- No utilizar otras drogas anticoccidianas simultáneamente en el alimento (con excepción del translope normal debido al cambio de anticoccidiano).
- No utilizar la tiamulina o troleandomicina en forma simultanea con la Salinomicina.
- Para evitar contaminación cruzada con otro alimento diferente al destinado para el pollo de engorda, se recomienda limpiar el sistema de mezclado.
- Lavar las manos después de su uso.
- No se administre este producto a bovinos en producción de leche que se destine al consumo humano.
- No se administre este producto a aves en producción de huevo que se destine al consumo humano.

### PERIODO DE RETIRO:

Suspender su administración a los animales destinados al consumo humano 5 días antes del sacrificio.